

Podmiot, który uzyskał zezwolenie : Natural Plant Protection; Route d"Artix -B.P.80 -64150 Nogueres, Francja; tel.: (33) 0559609292 , fax: (33) 05 59609299

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.; 01-756 Warszawa, ul.Przasnyska 6 B;
tel.: (0-prefiks-22) 866 41 80 , fax: (0-prefiks-22) 866 41 90;
e-mail: sekretariat.polska@arystalifescience.com

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

CARPOVIRUSINE SUPER SC

Biologiczny środek owadobójczy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą, o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owocówki jabłkóweczki w uprawach sadowniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji aktywnej:

1×10^{13} jednostek *Cydia pomonella* Granulosis Virus (CpGV)- entomopatogeniczny wirus z rodziny *Baculoviridae* w 1 l środka.

Zezw. MRiRW Nr R-12/2006 z dnia 07.04.2006 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-233/2007 z dnia 18.05.2007 r.



Drażniący

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody i na terenie rezerwatów.**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin ani jego opakowaniem.**

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

- jabłoń.

-owocówka jabłkówekczka.

-Zalecana dawka: 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Opryskiwać na początku wylęgania się larw pierwszego pokolenia (faza „czarnej główki”). Liczbę zabiegów dostosować do stopnia zagrożenia ze strony szkodnika w danym sezonie wegetacyjnym.

UWAGI:

1. Z uwagi na działanie żołądkowe środka ważne jest równomierne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. Zabieg powtórzyć po silnym opadzie deszczu (powyżej 20 mm) bezpośrednio po opryskiwaniu.
3. Środek w swym składzie posiada stabilizatory promieni UV, wspomagacze ułatwiające wchłanianie w przewodzie pokarmowym oraz substancje zachęcające do żerowania.

OKRES KARENCCI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) - nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI I ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszałem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszało hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu : 1 rok - w temperaturze 4-15°C, 2 lata – zamrożenie do temperatury co najmniej -18°C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia : niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16

Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99,

Lublin - (0-prefiks-81) 740-26-76

Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00,

Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46

Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09,

Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45

Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97,

Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08

Okres ważności - 1 rok - w temperaturze 4-15°C

- 2 lata - zamrożenie do temperatury co najmniej -18°C.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -